



Notícias

 Voltar



Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 - 08h29m

Eventos > Embrapa

SP: produtores rurais devem ficar atentos a casos de leptospirose bovina com aumento das chuvas, diz Embrapa

São Carlos/SP

A intensificação das chuvas nesse período é propícia para a proliferação de diferentes microrganismos causadores de doenças, como a leptospirose, que acomete diversas espécies de animais, incluindo os bovinos.

A infecção causa abortamentos em vacas no final da gestação na forma crônica da doença, já na aguda, em bovinos jovens e adultos, ocorrem lesões renais que podem levar à falência renal e à morte. De acordo com o médico veterinário Raul Mascarenhas, da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos - SP), os prejuízos para o pecuarista estão associados principalmente ao abortamento. "Como ocorre apenas ao final da gestação, muito provavelmente a vaca irá permanecer mais de um ano sem produzir leite. Outro prejuízo é a perda do bezerro, que pode ser uma fêmea leiteira ou um animal de elevado valor genético", explica Mascarenhas. O veterinário ressalta que ao evitar casos de abortamento, o produtor já paga o investimento de um ano em medidas preventivas adotadas.

A leptospirose é causada pela bactéria *Leptospira* spp, transmitida aos animais pela ingestão de pastagem contaminada ou contato com água ou solo encharcado contaminados. Em condições de baixa umidade ambiental e incidência direta de raios solares, essa bactéria só permanece viva por 30 minutos. Já em condições de alta umidade e de pH neutro ou levemente alcalino, a *Leptospira* pode sobreviver por semanas ou meses. Em meio aquoso, ela é capaz de se locomover até encontrar um hospedeiro, por esse motivo a leptospirose bovina é mais frequente nesta época de chuvas.

O veterinário recomenda fazer o diagnóstico de forma rotineira no rebanho em casos da presença da *Leptospira* spp nos animais de uma propriedade e também conhecer qual sorogrupo é predominante. Isso é feito por meio de exames de sangue.

"Por que isso é importante? Suponha que ao fazer exames de sangue nos animais, o sorogrupo mais comum encontrado seja o 'Icteriohaemorrhagiae', comum de roedores. Portanto, os ratos possuem um papel importante na transmissão da doença nesse rebanho. Ou pode ser que o sorogrupo predominante seja o 'Hardjo', mais comum de bovinos. Nesse caso, a transmissão da doença ocorre principalmente por meio dos próprios bovinos", esclarece.

Com essas informações o produtor poderá definir uma melhor estratégia de controle e prevenção. Se o problema for a *Leptospira* transmitida por ratos, o pecuarista terá que fazer um controle mais eficiente de roedores, mantendo os ambientes limpos de restos de comida, uso de armadilhas, acondicionamento e proteção da ração em depósitos, higienização frequente das instalações, etc. Se a transmissão estiver ocorrendo entre os próprios bovinos, Mascarenhas aconselha que o produtor foque em medidas que evitem a infecção, como redução e cercamento de áreas alagadas, vacinação e tratamento dos animais.

A vacinação contra a leptospirose não impede a infecção, mas reduz os sintomas. Quando necessária, essa medida de prevenção deve ser adotada no mínimo a cada seis meses. No entanto, dependendo da média mensal de casos de abortamentos no rebanho, essa aplicação deve ser realizada em intervalos menores, a cada quatro ou três meses. Além disso, como existe associação de leptospirose com a época chuvosa, é recomendado programar uma das vacinações para um mês antes do início desse período. Já o tratamento é feito com a aplicação do antibiótico estreptomicina.

Fonte: Embrapa Pecuária Sudeste



Imagens



Foto: Gisele Rosso / Embrapa

PARCEIROS



SIGA A PÁGINA RURAL
NO 

Últimas	Relacionadas	+ Lidas
	19/01 - 16:30	RS: coronavírus –comunicado Afubra, cancelada a Expoagro Afubra 2021
	19/01 - 16:26	SC: Secretaria da Agricultura interdita cultivos de ostras e mexilhões em São José e Biguaçu
	19/01 - 16:25	SP: coronavírus – exportações de suco de laranja recuam 23% entre julho e dezembro, diz Citrus BR
	19/01 - 16:19	SP: carrapato do bovino, é preciso estar atento a vários fatores para um controle efetivo do parasita no rebanho leiteiro, diz SAA
	19/01 - 15:27	MG: Serra da Mantiqueira registra colheita antecipada de azeitonas e safra de azeites de qualidade, diz Epamig
	19/01 - 15:17	BA: programa inicia diagnóstico de doenças visando melhorar a sanidade de caprinos e ovinos no Semiárido, diz Embrapa
	19/01 - 14:45	RS: curso do Senar-RS estimula a criatividade e a sustentabilidade
	19/01 - 14:45	SP: água de reuso diminui a pegada hídrica na suinocultura, apontam pesquisas do IZ
	19/01 - 14:34	SP: coronavírus – Colha e Pague de Morango em Atibaia é opção de passeio, diz Embrapa Meio Ambiente
	19/01 - 14:21	PR: fevereiro é época de controle da broca-da-erva-mate, principal praga dos ervais, diz Embrapa Florestas

