



Pesquisadora da Embrapa explica que controle da verminose em ovinos vai além da vermifugação

O controle da verminose nos ovinos nem sempre é simples, mas algumas medidas podem ser eficazes na prevenção e redução dos casos na propriedade.

Por [Pamella Kamiya](#) 25/01/2021 - 12:00 hs

Foto: [Gisele Rosso](#)



Ovinos e caprinos são susceptíveis aos vermes em todas as suas fases de produção. A verminose é um problema grave e muitos produtores acabam desistindo da atividade por conta dos prejuízos. De acordo com a pesquisadora Simone Niciura, da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP), isso acontece porque é o problema sanitário mais frequente nas criações.

“Quando não é controlada, ocorrem altas taxas de mortalidade nos rebanhos, principalmente dos cordeiros ou de raças mais sensíveis ou menos adaptadas aos trópicos. Além disso, há perdas produtivas, causadas pela diminuição no ganho de peso e no crescimento dos animais e queda na produção”, explica a pesquisadora.

O controle é ineficaz, na maioria dos casos, porque a estratégia utilizada é baseada sobretudo no tratamento com vermífugos. No entanto, com o passar do tempo, os vermes adaptam-se e tornam-se resistentes, principalmente pelo uso frequente e inadequado desses produtos.

Diferentes medidas podem ser utilizadas pelos ovinocultores para reduzir os casos de verminose na fazenda. O



Não-Me-Tox

Panambl/R

Ponta Gros

Ubiratã/PR

Londrina/PF

Cascavel/PI

Castro/PR (

Marechal C

(Copagril)

Pato Branco

Palma Solan

Rio do Sul/S

Rondonópo

Assessoria

Primavera d

Assessoria

Alto Garças

Assessoria

Itiquira/MT (

Comercial)

Tangará da

Campo Nov

Sorriso/MT

Disponível

Sorriso/MT

Balcão

São Gabriel

(Cooperoes

uso de ovinos mais resistentes é uma opção. “Esses animais toleram maior carga parasitária e não apresentam as mesmas perdas produtivas observadas nos ovinos mais sensíveis aos vermes. Isso pode ser obtido pela identificação e seleção de animais mais resistentes (e descarte de ovinos mais sensíveis), assim como pelo uso de raças mais resistentes na criação de animais puros ou para os cruzamentos”, conta Simone.

Outra maneira é a redução da contaminação das pastagens por meio da roçada para exposição dos parasitas ao sol, aumento do intervalo de tempo até a utilização do pasto novamente e, ainda, uso da pastagem para criação de outra espécie animal antes da nova introdução de ovinos.

A nutrição também é importante. O produtor precisa fornecer alimentação adequada à necessidade de cada categoria. Animais com dieta precária ficam mais vulneráveis ao agravamento dos sintomas causados pela verminose.

A pesquisadora recomenda que os pecuaristas tenham cautela e façam a vermifugação apenas dos ovinos que realmente precisam ser tratados, ao invés de tratar todo o rebanho indiscriminadamente. Segundo ela, além disso, para que os vermífugos continuem a funcionar por um período maior, antes que os vermes desenvolvam resistência, deve-se utilizá-los de maneira correta. É essencial a identificação dos animais e o controle dos ovinos vermifugados. A dose do anti-helmíntico depende do peso e da indicação do fabricante, seguindo as recomendações da bula. O ideal é que o produtor tenha uma balança na propriedade para evitar super ou subdosagem. Dessa forma, a resistência no rebanho pode ser adiada e as perdas produtivas reduzidas.

Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)



Deixe seu Comentário

0 comentários

Classificar por Mais antigos

Plugin de comentários do Facebook

Veja mais



PECUÁRIA
Preços da arroba do boi gordo e da vaca registram altas de 3,46% e 3,60%, aponta IFAG



PECUÁRIA
Preço da arroba bate recorde e indústrias apresentam dificuldade para encontrar boiadas

Maracaju/M
Cereais)
Campo Gra
Cereais)
Eldorado/M:
Amambai/M
Jataí/GO (S
Rio Verde/C
Brasília/DF
Oeste da Ba
Luis Eduarc
(Cooproeste
Cândido Mo
Porto Paran
Commoditie
Porto Paran
Commoditie
Porto Rio G
Commoditie
Porto Rio G
Commoditie
Porto Santo
Porto Santo
Porto Imbitu
(Belgrano C
Porto de Sã
(disponível)
Ltda)
Fech. 27/01

Siga

New

Cadast
informe
parceir