



[Início](#) / [Embrapa](#) / Pegada hídrica entre bovinos pode variar até sete mil litros por quilo de carcaça, diz Embrapa

Embrapa

Especialistas

Notícias

Pegada hídrica entre bovinos pode variar até sete mil litros por quilo de carcaça, diz Embrapa

É a primeira vez que é calculada no Brasil a pegada da carne bovina com dados gerados no próprio sistema de produção



Daniele Delgado  • 25 de março de 2021

 0  5 minutos de leitura





É a primeira vez que é calculada no Brasil a pegada da carne bovina com dados gerados no próprio sistema de produção

A individualidade dos bovinos impacta no valor da pegada hídrica na pecuária. Pesquisa realizada na [Embrapa Pecuária Sudeste](#) (SP) obteve diferenças que chegaram a sete mil litros de água por quilo de carcaça (carne + ossos) entre o valor médio e o valor máximo de pegada hídrica (PH) entre bovinos. O resultado revelou que é possível encontrar enormes diferenças entre animais no consumo da água durante a produção de carne bovina. Com isso, os cientistas concluíram que é fundamental considerar os animais individualmente para propor ações a fim de reduzir a pegada hídrica na pecuária de corte.

De acordo com o pesquisador da Embrapa [Julio Palhares](#), o cálculo empregado é inédito. Assim como é a primeira vez que é calculada no Brasil a pegada da carne bovina com dados gerados no próprio sistema de produção. Geralmente, são usadas fontes secundárias, como as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([IBGE](#)), por exemplo.

Mostrar mais 